

Prairies maigres de fauche de basse altitude

Code Natura 2000
6510
Code EUNIS
E2.21



Centauree noire



Luzule champêtre



Prairie maigre de fauche de basse altitude

Surface SIC : 114,63 ha /
Surface extensions : 167,69 ha

Intérêt patrimonial	Faible	Moyen	Fort
Typicité	Faible	Moyenne	Bonne
Représentativité	Faible	Moyenne	Bonne
Etat de conservation	Mauvais	Moyen	Bon

Caractères généraux

Prairies soumises à une ou deux fauches annuelles, après floraison des graminées, qui y sont dominantes (Fromental élevé, Brome mou...). Elles sont riches en espèces fleuries comme les Centaurees, l'Achillée millefeuille... Cette diversité diminue néanmoins avec l'enrichissement du sol. Il existe de nombreuses variantes entre le caractère frais ou sec du sol, selon les qualités du sol et en fonction de la gestion pratiquée.

Dans tous les cas, cet habitat est intimement lié à l'activité humaine qui seule permet son maintien.

Valeur écologique et patrimoniale

Participent grandement à la biodiversité des complexes pastoraux. Elles sont riches en espèces végétales et en insectes, elles constituent également des milieux ouverts propices à certains oiseaux (Pie-grièche écorcheur,...).

Espèces caractéristiques

Fromental élevé (*Arrhenatherum elatius*)
Flouve odorante (*Anthoxanthum odoratum*)
Luzule champêtre (*Luzula campestris*)
Centauree noire (*Centaurea gr. nigra*)
Achillée millefeuille (*Achillea millefolium*)

Espèce protégée

Orchis grenouille (*Dactylorhiza viridis*)

Etat de conservation

C'est l'habitat d'intérêt communautaire non forestier le plus représenté, il est présent sur l'ensemble du site Natura 2000, les surfaces importantes sont localisées au niveau des zones agricoles (Challes, vallée du Dinan, clairières de Grammont).

La déprise agricole a entraîné la raréfaction de ces prairies, surtout dans la partie nord, par abandon et enrichissement progressif ou par plantation de résineux. Au contraire, dans les zones agricoles encore dynamiques, ces prairies sont en mauvais état de conservation lié à la fertilisation ou à la conduite sous forme de prairies temporaires. Quelques beaux ensembles de prairies subsistent comme au niveau du vallon du Vivier (en dehors du SIC), mais leur existence semble précaire car étroitement liée au contexte agricole.